

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO IMMUNOTERAPII SWOISTEJ PODJĘZYKOWEJ (ODCZULANIA)

Celem immunoterapii swoistej jest zahamowanie dalszego rozwoju choroby alergicznej poprzez uzyskanie tolerancji na alergen, tak aby w przyszłości nie wywoływał on objawów chorobowych lub aby ich nasilenie było znacznie mniejsze.


Immunoterapia swoista podjęzykowa polega na podawaniu pod język szczepionki w postaci roztworu lub tabletek zawierających alergeny, na które pacjent jest uczulony.

KWALIFIKACJA DO LECZENIA

- Preparaty odczulające stosowane są wyłącznie u pacjentów zakwalifikowanych do tej metody leczenia przez lekarza.
- Przed rozpoczęciem terapii pacjent zgłasza się wraz z opiekunem na wizytę lekarską, podczas której oceniany jest stan zdrowia oraz wykluczane są przeciwwskazania.

PRZYGOTOWANIE DO PRZYJĘCIA PIERWSZEJ DAWKI


- Preparat należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta - pacjent i opiekun powinni zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania z lekiem.



- W dniu przyjęcia szczepionki pacjent powinien być w **dobrym ogólnym stanie zdrowia**.
- Opiekun musi poinformować lekarza o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta, także zleconych przez lekarzy innych specjalności (niektóre mogą być przeciwwskazaniem).
- Pacjent **nie może samowolnie odstawić leków** przyjmowanych na stałe.

PODANIE SZCZEPIONKI

- Pierwsza dawka podawana jest w gabinecie immunoterapii (**gabinet nr 26**) pod nadzorem pielęgniarki.
- Po przyjęciu pierwszej dawki pacjent pozostaje **co najmniej 30 minut pod obserwacją** (wymóg bezwzględny).



- Kolejne dawki przyjmowane są w domu pod nadzorem opiekuna, zgodnie z ustalonym schematem.
- Immunoterapia może być prowadzona:
- okołosezonowo (2–4 miesiące przed sezonem pylenia),
 - w trakcie sezonu pylenia,
 - całorocznie.

Czas trwania leczenia wynosi zazwyczaj **3–5 lat**.

KONTROLE W TRAKCIE LECZENIA

- Pacjent wraz z opiekunem zobowiązany jest do zgłaszania się na wyznaczone wizyty kontrolne.
- Podczas wizyt należy poinformować lekarza o wszystkich objawach, które mogły mieć związek z przyjmowanym preparatem.

Po podaniu preparatu mogą wystąpić łagodne, przemijające objawy, takie jak:

- świąd w okolicy podjęzykowej i języka,
- drętwienie języka, obrzęk warg,
- pęcherze w jamie ustnej, zapalenie ucha,
- świąd oczu, nieżyt nosa, kaszel,

- ból gardła i/ lub brzucha.
- Duże nasilenie objawów lub objawy uogólnione (np. nieżyt nosa, łzawienie oczu, duszność) są wskazaniem do podania leku przeciwhistaminowego i leku rozszerzającego oskrzela.
- **Nasilająca się duszność, pokrzywka lub spadek ciśnienia** wymagają pilnego kontaktu z lekarzem, wezwania pogotowia lub zgłoszenia się z dzieckiem na SOR.

WAŻNA INFORMACJA

Rezygnacja z immunoterapii może prowadzić do nasilenia objawów choroby alergicznej, do rozwoju nowych uczuleń i innych chorób alergicznych.

