

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII

Kolonoskopia to badanie diagnostyczne dolnego odcinka przewodu pokarmowego (jelita grubego i końcowego odcinka jelita cienkiego) przy użyciu endoskopu wyposażonego w kamerę. Podczas badania można pobrać wycinki histopatologiczne do badania histopatologicznego. Kolonoskopia z pobraniem wycinków umożliwia postawienie właściwej diagnozy, ocenę zaawansowania choroby i rokowania oraz podjęcie decyzji dotyczącej postępowania terapeutycznego. W naszej klinice badanie odbywa się zwykle w znieczuleniu ogólnym, u nastolatków w wybranych przypadkach istnieje możliwość wykonania badania w znieczuleniu miejscowym.

Przygotowanie do badania:

- Przyjęcie do oddziału w uzgodnionym terminie. Pacjent powinien zgłosić się na czczo, ze względu na konieczność wykonania badań laboratoryjnych w dniu przyjęcia.

W dniu przyjęcia do oddziału należy przyjąć leki, które dziecko przyjmuje na stałe, chyba że lekarz zalecił inaczej.

Do wykonania kolonoskopii całe jelito powinno być dokładnie oczyszczone z mas kałowych. Dlatego konieczne będzie przygotowanie według opisanych poniżej zasad.

Prosimy aby pacjenci usunęli lakier z paznokci oraz zdjęli manicure hybrydowy, żelowy i akrylowy przed przyjęciem do szpitala.

- Tydzień przed badaniem nie należy spożywać pokarmów zawierających drobne pestki i ziarna.

- W dniu poprzedzającym kolonoskopię pacjent powinien pozostawać na diecie płynnej.

- W godzinach popołudniowych w dniu poprzedzającym kolonoskopię w oddziale dziecko będzie przyjmowało preparat do oczyszczania jelit.

- W zależności od masy ciała dziecka lekarz prowadzący zaleca wypicie od 1 do 4 litrów preparatu do oczyszczania jelit. Dawkę preparatu lekarz dobierze indywidualnie dla każdego pacjenta. Aby poprawić walory smakowe preparatu dozwolone jest dodanie soku z cytryny do preparatu.

Prosimy zgłosić się do oddziału z dwiema butelkami wody niegazowanej. Można również zabrać ze sobą cytrynę lub sok z cytryny. Dodatek soku z cytryny może poprawić walory smakowe preparatu do oczyszczania jelit.

W razie nietolerancji doustnego przyjmowania preparatu istnieje możliwość (po wyrażeniu zgody przez rodziców i dziecko) czasowego założenia dziecku przez personel zgłębnika dożołądkowego i podaż preparatu tą drogą.

Dodatkowo wieczorem w dniu poprzedzającym oraz rano w dniu badania pacjent ma wykonywane w oddziale wlewki doodbytnicze.

- W dniu kolonoskopii dziecko pozostaje na czczo do czasu wykonania badania.

- Kolonoskopia w znieczuleniu wykonywana w trybie planowym nie powinna być przeprowadzana u pacjenta w trakcie aktywnej infekcji, ani w okresie do 2 tygodni od jej ustąpienia oraz 4 tygodni od zakończenia antybiotykoterapii.